

乳幼児健診 (4か月児健診、10か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診)
 身体測定、内科・歯科診察や栄養・歯科・発育など育児に関する相談を行います。
 ※対象者には、個別に案内を送付します。
 ●場所 あたご苑 ●受付時間 午後1時～1時30分

フッ素塗布
 歯磨き粉のようなゲル状のフッ素を歯ブラシを使って塗布します。虫歯予防に効果があります。おおむね3か月ごとの塗布が理想的です。最高7回。
 ●場所 あたご苑 ●受付時間 午後1時～1時20分
 ●対象 1歳6か月児健診～3歳児健診が終了するまでのお子さん
 ●持ってくるもの 母子健康手帳・普段使用している歯ブラシ・タオルなど
 ※歯磨きを済ませてきてください。また、食後満腹の状態でご来ないようにしてください。
 ※体調の悪い日のフッ素塗布は控えましょう。また、むし歯が多いと塗布できない場合があります。

発達相談【予約制】 事前に予約が必要です
 ことばや発達が気になるお子さんと、言語聴覚士・臨床心理士による個別面談を行います。●場所 あたご苑 ●時間 午前9時～正午

離乳食教室【予約制】 事前に予約が必要です
 ●場所 あたご苑 ●開始時間 午前10時～ ●対象 離乳食を必要とするお子さんのいるご家族の人(託児あり。要予約・先着順)
 ●持ってくるもの エプロン、ハンダナ、タオル、お子さんの持ちものなど

母子健康手帳交付
 ●交付場所 みやま市役所(本庁2階子ども子育て課)
 ※別日に受け取りを希望される場合は子ども子育て課へ事前に連絡ください。
 ●受付時間 午前10時15分～10時30分
 ●対象 みやま市に住民登録がある妊婦 ●持ってくるもの 妊娠届出書、マイナンバーカードまたは通知カードと顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

●予防接種実施医療機関(みやま市内のみ掲載) ※下記の医療機関のほか福岡県予防接種広域化に協力する医療機関でも接種できます。

医療機関	電話	ヒブ	小児用肺炎球菌	BCG	四種混合		二種混合		不活化ポリオ		MR	B型肝炎	水痘	日本脳炎		子宮頸がん予防	ロタウイルス(※3)	時間帯	
					乳幼児	小学生以上	乳幼児	小学生以上	乳幼児	小学生以上				乳幼児	小学生以上				
田中内科医院	63-8511	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	診療時間内で実施
あらかきクリニック	63-3369	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
まぐち胃腸科クリニック	63-2223	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
ほほえみクリニック	62-5050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※2
よしやま内科	62-6118														○				診療時間内で実施
山内医院	62-4131	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
あだち医院	63-2677	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
工藤内科	63-7711														○				〃
入江内科小児科医院	62-3552	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
大鶴脳神経外科	64-4130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
植田医院	67-2737	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
江の浦医院	22-5050	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	〃
いまいずみ内科 脳神経内科	22-2255														○				〃
ヨコクラ病院	22-5811	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	毎週木曜日診療時間内で実施

※1 月・火・水・金曜の午前8時30分～午後6時、土曜の午前8時30分～午後0時30分で実施
 ※2 診療時間内で実施。MR、水痘、B型肝炎は火曜、日本脳炎は金曜のみ実施
 ※3 令和2年8月1日以後生まれの人に限り

各種予防接種(個別接種)
 ●接種場所
 ①委託医療機関(上記に掲載)
 ②福岡県予防接種広域化に協力する医療機関
 ●持っていくもの
 母子健康手帳、予診票
 ●注意事項
 ①必ず事前に予約をしてください。
 ②「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、予防接種の内容をご理解のうえ、接種してください。
 ③保護者以外の親族が同伴する場合は、ワクチンごとに委任状が必要です。

●乳幼児健診等日程

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月
4か月児健診	15日 R1年11月生	14日 R1年12月生	3日 R2年1月生	2日 R2年2月生	5日 R2年3月生	3日 R2年4月生	7日 R2年5月生	5日 R2年6月生	2日 R2年7月生	14日 R2年8月生	3日 R2年9月生	4日 R2年10月生
10か月児健診	10日 R1年5月生	15日 R1年6月生	12日 R1年7月生	10日 R1年8月生	7日 R1年9月生	11日 R1年10月生	9日 R1年11月生	13日 R1年12月生	4日 R2年1月生	15日 R2年2月生	12日 R2年3月生	12日 R2年4月生
1歳6か月児健診	16日 H30年9月生	21日 H30年10月生	18日 H30年11月生	16日 H30年12月生	20日 H31年1月生	17日 H31年2月生	15日 H31年3月生	19日 H31年4月生	10日 R1年5月生	21日 R1年6月生	18日 R1年7月生	18日 R1年8月生
3歳児健診	23日 H29年3月生	28日 H29年4月生	25日 H29年5月生	30日 H29年6月生	27日 H29年7月生	24日 H29年8月生	22日 H29年9月生	26日 H29年10月生	17日 H29年11月生	28日 H29年12月生	25日 H30年1月生	25日 H30年2月生
フッ素塗布	16日	21日	18日	16日	20日	17日	15日	19日	10日	21日	18日	18日
発達相談	23日	28日	25日	30日	27日	24日	22日	26日	17日	28日	25日	25日
離乳食教室	—	20日	—	15日	—	16日	—	18日	—	20日	—	17日
母子健康手帳交付	8日・22日	13日・27日	10日・24日	8日・22日	12日・26日	9日・23日	14日・28日	11日・25日	9日・23日	13日・27日	10日・24日	10日・24日

●予防接種一覧

予防接種	対象者	接種回数など	異種ワクチン接種の間隔
ヒブ(インフルエンザ菌b型) 小児用肺炎球菌	生後2カ月～5歳未満	接種を開始した年齢(月齢)によって異なります	6日以上
BCG ※平成25年4月1日より対象年齢が1歳未満となりました。	生後1歳未満 (標準接種年齢=生後5カ月～生後8カ月)	1回	27日以上
四種混合(※4) (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)	1期初回 生後3カ月～7歳半未満 (標準接種年齢=生後3カ月～1歳) 1期追加 生後3カ月～7歳半未満	20日～56日あけて3回 1期初回(3回)終了後、1年～1年半後に1回	6日以上
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期 11歳～13歳未満 (標準接種年齢=小学6年生)	1回	6日以上
不活化ポリオ	1期初回 生後3カ月～7歳半未満 (標準接種年齢=生後3カ月～1歳未満) 1期追加 生後3カ月～7歳半未満	20日～56日あけて3回 1期初回(3回)終了後、1年～1年半後に1回	6日以上
麻しん風しん混合(MR)	1期 1歳～2歳未満 2期 小学校就学前の1年間 (平成26年4月2日～平成27年4月1日生)	1回 1回	27日以上
B型肝炎	1回目 2回目 3回目 生後1歳未満 (標準接種年齢=生後2カ月～生後9カ月)	1回 1回目終了後、27日以上あけて1回 1回目終了後、139日以上あけて1回	6日以上
水痘(水ぼうそう)	2回 1歳～3歳未満 (標準接種年齢=生後12カ月～15カ月未満)	1回目終了後、3カ月以上 (標準的には6～12カ月)あけて1回	27日以上
日本脳炎 ※平成7年4月2日～平成19年4月1日までの間に生まれた人も、従来の対象者に加えて定期接種の対象になりました。	1期初回 生後6カ月～7歳半未満 (標準接種年齢=3歳) 1期追加 生後6カ月～7歳半未満 (標準接種年齢=4歳) 2期 9歳～13歳未満 (標準接種年齢=小学4年生)	6日～28日あけて2回 1期初回(2回)終了後、おおむね1年後に1回 1回	6日以上
子宮頸がん予防(HPV)	小学校6年生～高校1年生の女子 (平成16年4月2日～平成21年4月1日生)	3回 サーバリックス(※5) ガーダシル(※6)	6日以上
令和2年10月より接種開始			
ロタウイルス (令和2年8月1日以後生まれの人に限り)	生後6週から生後24週まで(※7) 生後6週から生後32週まで(※7)	2回 3回	ロタリックス(※8) ロタテック(※8)

※4 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)を接種している人は、不活化ポリオの接種の必要はありません
 ※5 2回目は初回から1カ月後、3回目は初回から6カ月後
 ※6 2回目は初回から2カ月後、3回目は初回から6カ月後
 ※7 初回は生後6週から生後14週間6日までの接種が推奨されています。15週以降の初回接種はおすすめしません
 ※8 27日以上の間隔をあける